

Уважаемые специалисты здравоохранения, занимающиеся лечением пациентов с болезнью Паркинсона!

Сообщаем вам, что в настоящий момент в РФ доступен противопаркинсонический препарат из группы агонистов дофаминовых рецепторов – **Синдранол (ропинирол пролонгированного 24-часового действия)**. В конце данного информационного письма перечислены основные сети, в которых можно осведомиться о наличии препарата.

Синдранол (ропинирол пролонгированного 24-часового действия) является современным неэрголиновым агонистом дофаминовых рецепторов, у которого есть ряд фармакологических преимуществ:

- возможность приёма 1 раз в сутки, без учёта приёма пищи¹
- удобная гибкая титрация терапевтической дозы – шаг в 2 мг, и наличие соответствующих упаковок (2, 4 и 8 мг)¹
- пациенты могут быть сразу же переведены с терапии таблетками ропинирола с немедленным высвобождением на терапию таблетками пролонгированного действия Синдранол¹
- плавная кривая концентрации ропинирола в плазме в течение 24 часов, отсутствие флуктуаций²
- высокая специфичность в отношении D₂-рецепторов по сравнению с другими агонистами дофаминовых рецепторов³
- возможность применения как в монотерапии, так и в комбинации с леводопой. Применение совместно с леводопой позволяло снижать дозу последней примерно в 1,5 раза, понижая частоту дискинезий примерно в 5 раз⁴
- при раннем назначении препарат обладает более благоприятным профилем безопасности в сравнении с леводопой (меньшая частота флуктуаций и дискинезий), которая сохраняется в течение 10 лет от начала терапии⁵.

Согласно рекомендациям EFNS/MDS-ES⁶, ропинирол показал свою эффективность в следующих клинических ситуациях:

- Симптоматический контроль паркинсонизма в ранней стадии БП.
- Предотвращение двигательных осложнений.
- Уменьшение длительности периодов «выключения» при добавлении к леводопе в развернутой стадии БП.
- Улучшение качества сна в развернутой стадии БП.

Ропинирол 24-часового действия (Синдранол) можно назначать в виде монотерапии или в комбинации с леводопой у пациентов в ранней или развёрнутой стадиях болезни Паркинсона, в том числе в широкой амбулаторной практике.

1. Инструкция по медицинскому применению ЛП Синдранол (таблетки пролонгированного действия) РУ ЛП-003786 от 16.08.2021
2. Tompson DJ, Vearer D. Steady-state pharmacokinetic properties of a 24-hour prolonged-release formulation of ropinirole: results of two randomized studies in patients with Parkinson's disease. Clin Ther. 2007; 29(12): 2654-2666.
3. Schapira AHV. Neuroprotection and dopamine agonists. Neurology. 2002; 58 (Suppl 1): S9-S18.
4. Watts R.L., Lyons K.E., Pahwa R. et al.. Onset of Dyskinesia with Adjunct Ropinirole Prolonged-Release or Additional Levodopa in Early Parkinson's Disease. – Movement Disorders. – 2010.
5. Hauser R.A. et al. Mov. Disord. 2007; 22: 2409-2417; Parkinson Study Group. Arch. Neurol. 2009; 66: 563-570.

6. Summary of the recommendations of the EFNS/MDS-ES review on therapeutic management of Parkinson's disease. European Journal of Neurology 2013; 20: 5-15.

Список сетей:

Аптека.ру (arteka.ru) , Здравсити.ру (zdravcity.ru), СберЕаптека.ру (zdravcity.ru), Нео-фарм, Трика групп, АВЕ, Здоров.ру, Асна, Имплотия, Проаптека, Имплотия, Мелодия здоровья, Семейная аптека (Омск), Эдельвейс (Кемерово), Губернский лекарь (Барнаул), Губернские аптеки, ЖИВИКА, Планета здоровья (ОПЕКА), Ваша Аптека, Созвездие, Фармлэнд, Максавит, Гармония здоровья (Красноярск), Монастырёв.рф (Владивосток), О`vita (Владивосток), Семейная аптека (Благовещенск), АС НЕВИС, Родник здоровья, ДЛЯ БЕРЕЖЛИВЫХ (ИП Климов), Петербургские аптеки, Антей (Вологда), ВИТА (Самара), Волгофарм, Оренлек (Оренбург), Фармацевт плюс (Социальная аптека), Апрель, Магнит.